

Importante

La persona enferma no necesariamente debe estar internada. Puede seguir conviviendo con su grupo familiar siempre y cuando cumpla con el tratamiento.

Si conoce a una persona enferma de tuberculosis, no se asuste, si está en tratamiento, apóyela para que lo cumpla y de esta manera se cure y no contagie a nadie.

¿Qué medidas se pueden adoptar para prevenir la Tuberculosis?

Controlar a toda la familia y amigos que se frecuentan con la persona que tiene tuberculosis.

Vacunar al recién nacido, antes de los siete días de vida con la vacuna BCG para prevenir formas graves de Tuberculosis en los bebés, como la Meningitis Tuberculosa.

Cubrirse la boca al estornudar o toser con la parte interna del codo

Enseñar en las escuelas, en el barrio y en la comunidad que TODOS debemos participar de la lucha contra la Tuberculosis.

Programa Provincial de Control de la Tuberculosis
Secretaría de Planificación y Políticas Sanitarias



Programa Provincial de Control de la Tuberculosis
Secretaría de Planificación y Políticas Sanitarias

LA TUBERCULOSIS

SE CURA



El diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.



Gobierno de JUJUY
Ministerio de Salud

www.salud.jujuy.gob.ar

saludjujuy

saludjujuy

¿Que es?

La **Tuberculosis** es una enfermedad infecciosa y contagiosa causada por una bacteria llamada "Bacilo de Koch".

Afecta a los pulmones, aunque puede dañar también otros órganos como riñón, ganglios, huesos, etc.

La TBC es la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo.



¿Cómo se contagia?

Los enfermos que no están en tratamiento, **al toser o estornudar eliminan las bacterias al aire**, éstas pueden entrar a los pulmones de la persona sana.

Para que se produzca el contagio, el contacto debe ser diario.

Pero cuando la persona enferma se encuentra haciendo tratamiento, no contagia a otras personas.



La tuberculosis no se contagia por compartir el mate, cubiertos, vasos, etc. con una persona enferma.

¿Qué síntomas tiene?

Los síntomas de la tuberculosis pulmonar pueden incluir:



BAJAR DE PESO



TOS Y FLEMA POR MÁS DE 2 SEMANAS



SUDORES NOCTURNOS



DEBILIDAD O FATIGA



FIEBRE Y ESCALOFRÍOS



FALTA DE APETITO

LA LOCALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD EN OTROS ÓRGANOS CAUSA UNA AMPLIA VARIEDAD DE SÍNTOMAS

¿Cómo se trata?



Detectar la tuberculosis en forma temprana es una de las principales herramientas para combatir la enfermedad.

Para la cura total, el **tratamiento debe ser el adecuado y durante el tiempo indicado por el médico**, de esta manera, la persona enferma **logra curarse sin contagiar a otros.**

- El pronóstico es excelente si la tuberculosis pulmonar se diagnostica a tiempo y el tratamiento se inicia rápidamente.
- Existe personal de salud que supervisa la toma del medicamento, acompaña y ayuda a terminar el tratamiento.
- El tratamiento de la Tuberculosis dura por lo menos 6 meses, realizándose en general con pastillas, aunque también puede tratarse con inyecciones.
- El tratamiento se debe realizar sin interrupciones y completo.
- Es necesario efectuar el control médico de la familia, amigos y compañeros de trabajo, que son quienes acompañarán y ayudarán al paciente con Tuberculosis.
- Es esencial ventilar la casa y dejar que entre el sol.
- Se debe vacunar con BCG a los recién nacidos.



El diagnóstico y el tratamiento de la Tuberculosis son gratuitos en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.

Ante la persistencia de tos y flema por más de dos semanas, es importante consultar en un servicio de salud, para realizar el estudio de la flema (Baciloscopia), que es muy sencillo y empezar el tratamiento lo antes posible, de ser necesario.

Cualquier personal de salud puede pedir el estudio de la flema.